



Нобилис® ПАРАМИКСО_{P201}, Nobilis® PARAMYXO_{P201} – вакцина против парамиксовирусной инфекции голубей.

Состав:

Каждая доза (0,25 см³) содержит: антиген парамиксовируса голубей, штамм P201, $\geq 6,8 \log_2$ гемагглютинирующих единиц в РЗГА.

Вспомогательные вещества:

- Адъювант - жидкий парафин;
- Инактиват - формалин.

Фармацевтическая форма - эмульсия. Флаконы по 80 и 200 доз.

Иммунобиологические свойства.

Продукт стимулирует развитие активного иммунитета против парамиксовирусной инфекции голубей, вызванной инфицированием парамиксовирусов 1 типа. Формирование иммунитета происходит через четыре недели после первичной вакцинации. Продолжительность иммунитета не менее 1 года!

Показания к применению.

Вакцина предназначена для активной иммунизации голубей с целью защиты против клинических проявлений парамиксовирусной инфекции, вызванной инфицированием парамиксовирусов типа 1. В вакцинированных птиц выделение вируса в окружающую среду при инфицировании существенно снижено.

Противопоказания.

При применении согласно инструкции, противопоказания отсутствуют.

Меры предосторожности.

Вакцинировать только здоровых птиц.

Взаимодействие с другими средствами - не известно.

Особые указания.

Вакцинировать голубей позже, чем за четыре недели до начала сезона спаривания.

Применение.

Каждой птице, сзади шеи в средней и нижней части шеи, подкожно вводят по 0,25 см³ вакцины.

Вакцинируют голубей с 4-недельного возраста, за 6 недель до участия в соревнованиях, выставках и сезона спаривания. В дальнейшем вакцинацию проводят ежегодно.

Побочные эффекты - не наблюдаются.

Период выведения (каренции) - ноль дней.

Специальные предостережения для лиц и обслуживающего персонала, которые применяют ВИП. При случайном введении человеку немедленно сообщить врачу, показав открытку-вкладыш или упаковку препарата и проинформировав, что вакцина представляет собой водно-масляную эмульсию. У человека возможны локальные реакции по месту инъекции вакцины.

Особые меры безопасности при обращении с неиспользованным ВИП, способы его обезвреживания и утилизации. - неиспользованный и просроченный препарат, упаковку следует утилизировать в соответствии с действующим законодательством (кипятят или сжигают).

Срок годности: 24 месяца.

После вскрытия флакона вакцину использовать в течение трех часов.

Условия хранения и транспортировки: хранить в сухом, темном месте при температуре от 2 °до 8 ° С. Не замораживать.

Упаковка – флакон с закрытый пробкой с нитрилового резины и кодированным алюминиевым колпачком.

Название и местонахождение владельца регистрационного удостоверения и производителя:
Интервет Интернэшнл Б.В., Вим де Корверштраат 35, 5831 АН Боксmeer, Нидерланды.

Правила отпуска - без рецепта.