COLINAK NH

инъекционная эмульсия

Производитель : MEVAK AO, Словацкая Республика
Организатор: MEVAK AO, Биоветская 32, почтовый ящик 29/c, 949 91 Нитра, Словакия
Состав: 1 доза вакцины (0,3 мл) содержит:

Активные вещества: Paramyxovirus pseudopestis avium ante inact. phyl. M/93 мин. $10^{8,0}$ $EID_{50,}$ Herpesvirus columbae ante inact. phyl. V-5443 мин. $10^{4,0}$ $TCID_{50}$

Вспомогательные вещества: Formaldehydum макс. 0,05%, Thiomersalum макс. 0,005 %, Montanide ISA 70.

Описание препарата: Бело-розовая эмульсия.

Упаковка: 15 мл, 20 мл, 50 мл, 10 x 15 мл, 10 x 20 мл, 10 x 50 мл.

Фармакологическая группа: Veterinaria immunopraeparata.

Форма лекарства: Инъекция.

Целевой вид: Голуби.

Характеристика: Инактивированная масляная вакцина для профилактической вакцинации голубей против парамиксовирусной и герпесвирусной болезней.

Показания: В питомниках с низким риском заражения прививается молодняк в возрасте 5 недель. Ревакцинация проводиться через 4 - 6 недель.
В питомниках с повышенным проявлением псевдочумы птиц, прививается молодняк в возрасте 5 недель, ревакцинация проводиться через 3 - 4 недели после первой вакцинации той же дозой. Вторая ревакцинация проводиться через 2 недели.
Взрослые голуби прививаются один раз каждые 6 месяцев, также перед каждым летным и выставочным сезоном, не позднее чем за 14 дней перед началом тренировочных полетов.

Противопоказания: Прививаются только здоровые голуби. Не прививаются голуби с клиническими признаками инфекционных болезней или болезней органов.

Взаимодействия: Одновременно с применением лекарства не рекомендуется давать антибиотики и химиотерапевтические препараты.

Побочные эффекты: В месте введения препарата, в некоторых случаях, может возникнуть легкий отек, который до 21 дня рассосется.

Предупреждение: Содержание флакона перед применением основательно взболтать и нагреть до комнатной температуры (+15 - +25°C).

Личные меры безопасности для людей дающих препарат животным: Это лекарство содержит минеральное масло. Случайный укол может привести к сильной боли и возникновению отека. Если вакцина была введена в сустав или палец, в экстренных случаях может дойти к потере пальца, если во время не будет оказана квалифицированная медицинская помощь. При случайном уколе препаратом НЕМЕДЛЕННО ищите квалифицированную медицинскую помощь, даже в случае введения малого количества лекарства. Если боль не пройдет по истечении 12 часов после медицинского обследования, повторно обратитесь к врачу.

Дозировка: 0,3 мл (1 доза).

Способ применения: Подкожно в области колена, либо в области шеи.

Примечание: Иммунитет возникает до 14 дней и длится минимально 6 месяцев.

Охранный период: Без охранного периода.

Срок хранения: 2 года, после вскрытия 8 часов.

Способ хранения: При температуре от +2 до +8 °C, в сухом месте, беречь от попадания света, не замораживать. Держать вдали от детей!

ТОЛЬКО ДЛЯ ЖИВОТНЫХ. ТОЛЬКО ПО РЕЦЕПТУ ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА.